L'esperimento CMS al CERN

Davide Bruschini¹

1: Scuola Normale Superiore e INFN Sezione di Pisa

Large Hadron Collider

- 27 km di circonferenza, profondità di circa 100 m
- I fasci di protoni vengono accelerati a 7 TeV e collidono in quattro punti, in ciascuno c'è uno degli esperimenti
- I fasci sono divisi in circa 2800 pacchetti da circa 10^{11} protoni ciascuno
- Collisioni ogni 25 ns, per un rate di 40 Mhz

L'esperimento CMS

- Costituito da vari detector disposti a strati disposti intorno alle collisioni pp di LHC
- Ogni detector rivela un determinato di particelle:
 - Le particelle interagiscono con il materiale del rivelatore
 - Produzione di un segnale elettrico, memorizzato e successivamente interpretato
- L'insieme dei segnali elettrici viene poi "ricostruito" e si risale alla fisica dell'evento

CMS DETECTOR

Total weight : 14,000 tonnes
Overall diameter : 15.0 m
Overall length : 28.7 m
Magnetic field : 3.8 T

STEEL RETURN YOKE

12,500 tonnes

SILICON TRACKERS

Pixel ($100 \times 150 \mu\text{m}^2$) $\sim 1.9 \text{ m}^2 \sim 124\text{M}$ channels
Microstrips ($80\text{--}180 \mu\text{m}$) $\sim 200 \text{ m}^2 \sim 9.6\text{M}$ channels

SUPERCONDUCTING SOLENOID

Niobium titanium coil carrying $\sim 18,000 \text{ A}$

MUON CHAMBERS

Barrel: 250 Drift Tube, 480 Resistive Plate Chambers
Endcaps: 540 Cathode Strip, 576 Resistive Plate Chambers

PRESHOWER

Silicon strips $\sim 16 \text{ m}^2 \sim 137,000$ channels

FORWARD CALORIMETER

Steel + Quartz fibres $\sim 2,000$ Channels

CRYSTAL
ELECTROMAGNETIC
CALORIMETER (ECAL)
 $\sim 76,000$ scintillating PbWO_4 crystals

HADRON CALORIMETER (HCAL)
Brass + Plastic scintillator $\sim 7,000$ channels

Gli strati di CMS

Solenoidi superconduttore

- In CMS circonda tutti i rivelatori tranne lo spettrometro muonico (descritto nel seguito).
- Il solenoide di CMS fornisce al suo interno un campo magnetico pressoché uniforme di 3.8T.
- È circondato da strati di ferro collocati all'interno delle camere muoniche per concentrare le linee di ritorno del campo magnetico, generando un campo magnetico di 2T.
- Le particelle cariche curvano per effetto del campo magnetico e questo serve per misurare il loro impulso.

$$p_T[\text{GeV}] = 0.3B[\text{T}]R[\text{m}]$$

Il tracciatore

- Il detector più vicino al punto di interazione, composto interamente di silicio
- Permette di ricostruire le traiettorie delle particelle cariche
- Le particelle cariche interagiscono con gli atomi di silicio, strappando i loro elettroni:
 - Si produce un segnale elettrico che viene poi raccolto
- Il forte campo elettrico presente sposta gli elettroni generando quindi un segnale elettrico.
- CMS tracker:
 - 4 layer di pixel ($100 \times 150 \mu\text{m}^2$)
 - 10 layer di strip ($5 \text{ cm} \times 100 \mu\text{m}$)
 - 124 M di pixel, 10 M di strip

Foto del CMS outer tracker. Pisa è direttamente coinvolta nello sviluppo di questo rivelatore

Il calorimetro elettromagnetico

- Permette di misurare interamente l'energia di γ , e^- , e^+
- Quando un fotone di alta energia attraversa il calorimetro, esso produce una coppia di $e^+ e^-$. Sia e^+ che e^- possono perdere energia sotto forma di fotoni (bremsstrahlung), che a loro volta creano coppie $e^+ e^-$, formando uno sciame elettromagnetico
- Le particelle cariche prodotte nello sciame eccitano gli elettroni degli atomi del calorimetro, che poi emettono luce visibile, poi raccolta e convertita in un segnale elettrico.
- A CMS il calorimetro EM è costituito da cristalli di tungstenato di piombo ($PbWO_4$). Riesce a contenere tutto lo sciame elettromagnetico pur essendo spesso 23 cm
- La risoluzione in energia è data dalla seguente formula

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{2.8\%}{\sqrt{E(\text{GeV})}} \oplus \frac{12\%}{E(\text{GeV})} \oplus 0.3\%$$

- Anche altre particelle cariche (muoni e adroni carichi) rilasciano piccoli segnali all'interno del calorimetro elettromagnetico.

Il calorimetro adronico

- Deve fermare gli adroni, particelle che interagiscono con le interazioni forti.
- È costituito da lastre di ottone o di acciaio (mezzo passivo) alternate a strati di scintillatore (mezzo attivo):

- Le interazioni forti degli adroni avvengono nelle lastre di ottone o acciaio.
- Le particelle cariche prodotte interagiscono con lo scintillatore → eccitazione degli atomi → emissione di luce.

- La risoluzione è data da:

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{110\%}{\sqrt{E(\text{GeV})}} \oplus 9\%$$

Ottone usato in calorimetro CMS

Dall'artiglieria usata dai Russi

Spettrometro muonico

- Rivelatori a gas che misurano la posizione dei muoni.
- I muoni, a differenza delle altre particelle, sono estremamente penetranti, e sono gli unici che arrivano alle camere, tutte le altre vengono fermate negli strati precedenti.
- I neutrini, che interagiscono solo attraverso le interazioni deboli, non vengono rivelati:
 - Nelle collisioni tra protoni la somma vettoriale degli impulsi delle particelle nel piano trasverso è uguale a zero, quindi si usa energia trasversa mancante o MET per dedurre l'esistenza di neutrini nell'evento

$$\vec{MET} = - \sum_{\text{particelle misurate}} \vec{p}_T$$

Preso dati: trigger

- LHC fa collidere protoni con protoni circa 40 milioni di volte al secondo
- In ciascuna di queste collisioni vengono prodotte fino a 60 interazioni simultanee (pile-up)
- Quindi i rivelatori di CMS devono essere in grado di processare i segnali in soli 25 ns

Preso dati: trigger

40 MHz
~50 m

100 kHz
~400 m

1 kHz
~10 km

1 kHz
~10000 km

- Non tutti gli eventi possono essere salvati (40 kB/evento $\rightarrow$ 16 TB/s).
- Il sistema di trigger serve a selezionare gli eventi interessanti
- Lo fa in due step:
 - In uno stadio in cui viene utilizzato solo hardware (L1 trigger), a fianco di CMS
 - In superficie, dove viene impiegato il software di ricostruzione (HLT)

Preso dati: L1

40 MHz
~50 m

100 kHz
~400 m

1 kHz
~10 km

1 kHz
~10000 km

- I segnali elettronici prodotti dai rivelatori vengono portati nella “counting room” a 50 m da CMS
- Si ha una prima ricostruzione semplificata dei vari oggetti usando le informazioni dei calorimetri e dello spettrometro muonico, a 40 MHz
- Gli eventi che passano alcuni requisiti vengono passati al livello successivo, altrimenti vengono scartati (e quindi persi)
- Questo riduce il rate di eventi da processare da 40 Mhz a circa 100 kHz
- Per ogni evento questo richiede qualche microsecondo

Preso dati: HLT

40 MHz
~50 m

100 kHz
~400 m

1 kHz
~10 km

1 kHz
~10000 km

- Per gli eventi che passano L1 viene poi processata l'informazione di tutti i rivelatori
- L'evento viene portato in superficie, dove una farm di 16000 CPU ricostruisce con una precisione superiore a L1 gli eventi, e vengono salvati solo quelli che passano alcuni requisiti particolari
- Questo riduce il rate da 100 kHz a circa 1 kHz
- Il tempo impiegato per processare un evento è circa 200 ms

Presi dati: ricostruzione

40 MHz
~50 m

100 kHz
~400 m

1 kHz
~10 km

1 kHz
~10000 km

- Tutti gli eventi che vengono poi definitivamente salvati su nastro e portati al sito CERN di Meyrin dove si trova il Tier-0
- Vengono poi inviati ai centri sparsi per il mondo dove vengono poi ricostruiti con la massima precisione possibile dalle informazioni dei vari sottorivelatori per avere un'interpretazione completa dell'evento (Tier 1)
- Questo processo di ricostruzione richiede 60 s per evento
- Questi vengono poi inviati ai vari siti che effettuano l'analisi dei dati e generano le varie simulazioni degli eventi per estrarre i risultati di fisica

Scoperta Higgs

- Questi vengono poi inviati ai vari siti che effettuano l'analisi dei dati e generano le varie simulazioni degli eventi per estrarre i risultati di fisica
- CMS è stato dei due esperimenti ad annunciare la scoperta del bosone di Higgs:
 - Ultimo pezzo del Modello Standard
 - Nobel per la fisica nel 2013
- Misura di precisione delle proprietà, per studio del Modello Standard:
 - Al momento il Modello Standard sopravvive

Massa del bosone W

- W è uno dei mediatori delle interazioni deboli
- La sua massa è predetta con estrema precisione nel Modello Standard:
 - Nuove particelle possono entrare in loop agli ordini successivi

Ordine “albero”

Ordini successivi

Sensibilità a particelle oltre SM

Massa del bosone W

- Confronto tra determinazione del Modello Standard e misure sperimentali
- **In verde:** situazione prima del 2022:
 - Accordo con il Modello Standard. Obiettivo è quindi migliorare la precisione sia sperimentale che teorica, per testare SM con precisione maggiore
- **In rosso:** situazione dopo 2022:
 - Le due misure più precise sono in forte disaccordo. CDF in disaccordo con SM a 7σ !
 - Occorre nuova misura che possa risolvere il puzzle

Misura di massa del bosone W

- CMS pubblica a settembre 2024 la sua tanto attesa misura:
 - Forte coinvolgimento di Pisa
 - Alcune persone hanno lavorato 10 anni a questo risultato!
- Conferma del Modello Standard:
 - Precisione compatibile con quella di CDF, che è tutt'ora la più precisa di sempre

Buon viaggio!

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{SM} = & -\frac{1}{2}\partial_\nu g_\mu^a \partial_\nu g_\mu^a - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\nu^a g_\mu^b g_\nu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^b g_\nu^c g_\mu^d g_\nu^e - \partial_\nu W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
& M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\nu Z_\mu^0 \partial_\nu Z_\mu^0 - \frac{1}{2c_w^2} M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - igc_w (\partial_\nu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
& W_\nu^+ W_\mu^-) - Z_\nu^0 (W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)) - \\
& ig_s w (\partial_\nu A_\mu (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\nu^+ W_\mu^-) - A_\nu (W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+) + A_\mu (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
& W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)) - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\nu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\mu^- W_\nu^+ + g^2 c_w^2 (Z_\mu^0 W_\mu^+ Z_\nu^0 W_\nu^- - \\
& Z_\mu^0 Z_\nu^0 W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w^2 (A_\mu W_\mu^+ A_\nu W_\nu^- - A_\mu A_\nu W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w c_w (A_\mu Z_\nu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
& W_\nu^+ W_\mu^-) - 2A_\mu Z_\mu^0 W_\nu^+ W_\nu^-) - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\
& \beta_h \left(\frac{2M^2}{g^2} + \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right) + \frac{2M^4}{g^2} \alpha_h - \\
& g\alpha_h M (H^3 + H\phi^0 \phi^0 + 2H\phi^+ \phi^-) - \\
& \frac{1}{8}g^2 \alpha_h (H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2) - \\
& gM W_\mu^+ W_\mu^- H - \frac{1}{2}g \frac{M}{c_w} Z_\mu^0 Z_\mu^0 H - \\
& \frac{1}{2}ig (W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)) + \\
& \frac{1}{2}g (W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) + W_\mu^- (H \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu H)) + \frac{1}{2}g \frac{1}{c_w} (Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) + \\
& M (\frac{1}{c_w} Z_\mu^0 \partial_\mu \phi^0 + W_\mu^+ \partial_\mu \phi^- + W_\mu^- \partial_\mu \phi^+)) - ig \frac{s_w^2}{c_w} M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + ig_s w M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - \\
& W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + ig_s w A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \\
& \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- (H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-) - \frac{1}{8}g^2 \frac{1}{c_w} Z_\mu^0 Z_\mu^0 (H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-) - \\
& \frac{1}{2}g^2 \frac{s_w^2}{c_w} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{s_w^2}{c_w} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\
& W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{s_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\mu \phi^+ \phi^- - \\
& g^2 s_w^2 A_\mu A_\nu \phi^+ \phi^- + \frac{1}{2}ig_s \lambda_{ij}^a (\bar{q}_i^a \gamma^\mu q_j^a) g_\mu^a - \bar{e}^\lambda (\gamma^\mu + m_e^\lambda) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda (\gamma^\mu + m_\nu^\lambda) \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma^\mu + \\
& m_u^\lambda) u_j^\lambda - \bar{d}_j^\lambda (\gamma^\mu + m_d^\lambda) d_j^\lambda + ig_s w A_\mu (-(e^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu u_j^\lambda) - \frac{1}{3}(\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu d_j^\lambda)) + \\
& \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 \{(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{4}{3}s_w^2 - 1 - \gamma^5) d_j^\lambda) + \\
& (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{8}{3}s_w^2 + \gamma^5) u_j^\lambda)\} + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ ((\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) U^{lep}{}_{\lambda\kappa} e^\kappa) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\lambda\kappa} d_j^\kappa)) + \\
& \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- ((\bar{e}^\kappa U^{lep}{}_{\kappa\lambda}^\dagger \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\kappa C_{\kappa\lambda}^\dagger \gamma^\mu (1 + \gamma^5) u_j^\lambda)) + \\
& \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_e^\kappa (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}{}_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) e^\kappa) + m_\nu^\kappa (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}{}_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) e^\kappa) + \\
& \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_e^\lambda (\bar{e}^\lambda U^{lep}{}_{\lambda\kappa}^\dagger (1 + \gamma^5) \nu^\kappa) - m_\nu^\kappa (\bar{e}^\lambda U^{lep}{}_{\lambda\kappa}^\dagger (1 - \gamma^5) \nu^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} H (\bar{\nu}^\lambda \nu^\lambda) - \\
& \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} H (\bar{e}^\lambda e^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} \phi^0 (\bar{\nu}^\lambda \gamma^5 \nu^\lambda) - \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} \phi^0 (\bar{e}^\lambda \gamma^5 e^\lambda) - \frac{1}{4} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\kappa}^R (1 - \gamma_5) \hat{\nu}_\kappa - \\
& \frac{1}{4} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\kappa}^R (1 - \gamma_5) \hat{\nu}_\kappa + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_d^\kappa (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) d_j^\kappa) + m_u^\kappa (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) d_j^\kappa) + \\
& \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_d^\kappa (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 + \gamma^5) u_j^\kappa) - m_u^\kappa (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 - \gamma^5) u_j^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \\
& \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^2}{M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \bar{G}^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc} \partial_\mu \bar{G}^a G^b g_\mu^c + \\
& \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + igc_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X^- - \\
& \partial_\mu \bar{X} + X^0) + ig_s w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \partial_\mu \bar{X} + Y) + igc_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \\
& \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + ig_s w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + igc_w Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\
& \partial_\mu \bar{X}^- X^-) + ig_s w A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\
& \partial_\mu \bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}gM (\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w} \bar{X}^0 X^0 H) + \frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM (\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-) + \\
& \frac{1}{2c_w} igM (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + igM s_w (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + \\
& \frac{1}{2}igM (\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0) .
\end{aligned}$$